

## SH-Levamisol conc. pulvis ad us. vet.

**Összetétel:** Levamisol (sósavas só formájában) 100 %

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** SelBruHa Állatgyógyászati Kft.,  
Budapest

**Gyártó:** Pernix-Pharma Kft., Zalaegerszeg

**Célállatfajok:** szarvasmarha, sertés, juh, házityúk (brojlercsirke) és házilúd

### **Javallatok:**

Az SH-Levamisol conc. pulvis széles hatásspektrumú anthelmintikum, mely alkalmas különböző fejlődési formában lévő parazita fajok okozta fertőzések kezelésére:

Sertésben: *Ascaris* spp, *Oesophagostomum* spp., *Metastrongylus* spp. (érett stádiumú), *Hyostrongylus* spp.

Szarvasmarhában és juhokban: *Dictyocaulus* spp., *Cooperia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp. és *Chabertia* spp

Baromfiban(házityúk, házilúd): *Ascaridia* spp, *Heterakis* spp, *Capillaria* spp.

### **Adagolás célállat fajonként:**

A hatóanyag ajánlott dózisa

- sertés esetében 8 mg/ttkg levamisol-hidroklorid/testtömegkilogramm,
- házityúk (brojlercsirke) és házilúd esetében 20 mg levamisol-hidroklorid/testtömegkilogramm
- szarvasmarha és juh esetében 7,5 mg levamisol-hidroklorid/testtömegkilogramm.

### **Adagolás és alkalmazásmódok:**

Ivóvízbe keverve alkalmazandó.

1 g SH-Levamisol conc. pulvis baromfi esetében 50 kg élősúly, sertés esetében 125 kg élősúly, szarvasmarha, juh és kecske esetében 133 kg kezelésére elegendő.

A kezelt állatállomány testtömege és napi ivóvízfogyasztása alapján kell meghatározni az ivóvízbe bekeverendő gyógyszer mennyiségét.

Az elkészített gyógyszeres ivóvíz azonnal, de legfeljebb 24 órán át itatható.

### **Felhasználási javaslat:**

Kezelési program: Rutin állománykezelés – mint irányelv; valamennyi a legelőn fertőzésnek kitett állatot kezelni kell 10 hetenként, március/április-tól október/november-ig.

Valamennyi, a legelőn tartott állat egyszerre kezelendő! Behajtás után egy január/februári kezelés szintén indokolt. Ez a kiegészítő kezelés segít megelőzni, hogy tavasszal a legelő újra fertőződjön.

Bármely új állatot kezelni kell, mielőtt csatlakozik az állományhoz. Speciális kezeléshez ki kell kérni az állatorvos véleményét.

Az istállózott állatokat, akár battérián, akár mélyalmon vannak 10 hetes időközökkel célszerű kezelni. Az újrafertőződés esélyét úgy lehet lecsökkenteni, ha valamennyi állatot egyszerre kezeljük az istállón belül.

**Ellenjavallatok:** Máj vagy veseelégtelenség esetén ne kezeljük a készítménnyel az állatot. Megfelelő elővigyázatossággal kezeljük előrehaladottan vemhes, rossz kondícióban, erős stresszhelyzetben levő (karámozás, kezelés) állatokat, ill. időjárás front esetén.

Ne kezeljük az állatokat szerves foszforsav- és/zsír tartalmú szerekkel történő kezelés előtt, ill. után, 14 nappal.

**Mellékhatások:** Néha előfordulhat a motoros funkciók zavara, mint pl. izomgörcs vagy fokozott nyálzás, azonban ezek átmeneti jellegűek.

**Élelmezés- egészségügyi várakozási idő:**

Szarvasmarha ehető szövetek: 7 nap.

Juh ehető szövetek: 7 nap.

Sertés ehető szövetek: 7 nap.

Házityúk (brojlercsirke), házilúd ehető szövetek: 7 nap.

A készítménnyel árutójás- és tejtermelő állományok nem kezelhetők!

**Különleges tárolási előírások:**

**Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!**

25 °C alatt, száraz helyen tárolandó.

**Lejáratási idő: 3 év**

A felbontott tasak nem tárolható.

**Különleges figyelmeztetések:**

Mebendazollal, pirantellel, fenothiazinnal, procainnal vagy szerves foszforsav észterekkel nem adható.

Vemhesség esetén kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható.

Ha az előírt adagot túllépjük, előfordulhat a motoros funkciók zavara, mint pl. az izomgörcs vagy fokozott nyálzás, azonban ezek átmeneti jellegűek. Antidotum az atropin-szulfát.

Ne egyen, igyon vagy dohányozzon kezelés közben! Ha szembe, vagy bőrre került a készítmény, azonnal mossa le! Szennyezett ruháját cserélje ki! Kezelés után, evés előtt mosson kezet!

A levamisol igen ritkán okozhat idioszinkrázias reakciókat vagy vérkeringési problémákat. Ha szédülés, hányinger, hányás, vagy gyomorpanaszok jelentkeznek a készítmény használata után vagy lázat, száj-, torok-gyulladást érzelenek, azonnal forduljanak orvoshoz.

**A fel nem használt készítmény vagy hulladékának kezelésére, megsemmisítésére vonatkozó utasítások:**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**A használati utasítás utolsó jóváhagyásának dátuma:**

2006. 09. 15.

**Rendelhetőség:** Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

**Forgalmazhatóság:** Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**Kiszerezési egységek és bonthatóság:**

1.000 g, 200 g hegesztéssel lezárt triplex fólia tasakban

10 x 2 g, hegesztéssel lezárt triplex fólia tasakban, kartondobozban (bontható)

**Törzskönyvi szám: 1479/2005**